

Použití a dávkování Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI:

Použití	k prevenci a ošetření bakteriálních onemocnění KOI
	k optimalizaci a srovnání trávení KOI
	k ošetření a dobrému hojení ran bez vzniku jizev
	obnova biologické rovnováhy v zahradním jezírku
	k posílení imunitního systému KOI
Běžná dávka	1l na 20 000l vody v zahradním jezírku, léčbu lze opakovat
Preventivní opakující se dávka	1/3 - 1/2l / 20 000l vody v zahradním jezírku

Aplikace Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI:

Aplikace	polovinu litrového balení nalijte do 10l kýble s 9l vody z vašeho jezírka a trochou odstáté teplé vody (nesmí být horká), celková teplota vody v nádobě má být 23 - 26 °C
	ponechte 2 minuty odstát, aby bakterie měly šanci se aktivovat
	vypněte UV lampu nebo ozonizér a skimmer na dobu minimálně 48h
	rozmíchaný obsah z kýble rovnoměrně rozlít po ploše zahradního jezírka (třeba hrníčkem, nepoužívejte konev s kropátkem, zane se)
	vzniklé hrudky slouží jako potrava pro bakterie mléčného kvašení, KOI hrudky požírají a dochází k optimalizaci jejich trávení
	po aplikaci se voda na několik hodin zakalí, max. na 24h
Doporučení	aplikujte při teplotách vody nejméně 8 - 10 °C, optimum 19 - 20 °C
	aplikovat preventivně zejména na jaře a na podzim
	aplikace v létě snižuje riziko botulismu
	celoroční prevence začíná aplikací na jaře při teplotách vody nad 8 - 10 °C, opakovat aplikaci každých 4 - 5 týdnů (1/3 - 1/2 dávkou)
	doporučujeme aplikovat preventivní dávku před odjezdem na dovolenou

Léčba ran	výsledky ošetření jsou vidět za 4 - 6 dní (chladnější voda zpomaluje účinky), objeví se šedivá vrstva na povrchu rány, hojení je v plném procesu, po odpadnutí této vrstvy se rána brzy zacílí, obnova šupin trvá déle než obnova svaloviny, barva nově vzniklých šupin se může lehce lišit od ostatních
-----------	--

Skladování Anarex Bio pro ošetření onemocnění a ran KOI:

- neotevřené balení lze skladovat po dobu tří let na chladném a tmavém místě
- po otevření lze skladovat po dobu přibližně jednoho roku na chladném a tmavém místě
- před použitím vždy protřepat
- pokud je obsah zkažený, nelze ho již použít
- skladování v lednici není nutné u skladovacích teplot nižších než 30 °C
- chraňte Anarex Bio před mrazem, minimální skladovací teplota 2 °C